

**Rectogesic® Förkortad
förskrivningsinformation**

Läs produktresumén (SPC) innan
läkemedlet skrivs ut.

Produktbeskrivning: Rectogesic®
4 mg/g rektalsalva innehåller 0,4 %
glyceryltrinitrat (GTN) (4 mg/g)
COSA X06 **Rx F**

Indikationer: Lindring av smärta
orsakad av kroniska analfissurer.
Dosering och administreringsätt: En
2,5 cm lång sträng av salvan mäts upp
längs fingertoppen med hjälp av
doseringslinjen som finns på utsidan av
förpackningskartongen. Fingret kan
skyddas med en fingerfuta, plastfilm eller
på annat lämpligt sätt. Det täckta fingret
förs försiktigt in i analkanalen till den
första interfalangealeden och salvan
appliceras runtom i analkanalen.

Rekommenderas inte till barn under 18 år.

Biverkningar: Mycket vanliga –
dosrelaterad huvudvärk (varav minst
50 % kan behandlas med milda
analgetika), som kan återkomma vid
varje daglig dos. Vanliga – smärta,
illamående och yrsel. Mindre vanliga –
diarré, kräkning, rektalblödning, rektal
störning, anal sveda och klåda,
takykardi, svimning, instabil angina och
hastig blodtrycksstegring, allergiska
reaktioner (främst kontaktdermatit eller
läkemedelsutslag som uppstått hos
patienter som fått glyceryltrinitrat som
salva eller plåster). Det har förekommit
några rapporter om äkta anafylaktiska
reaktioner och dessa reaktioner kan
förmodligen uppkomma hos patienter
som får glyceryltrinitrat oavsett
administreringsätt. Extremt sällsynta –
vanlig dosering av organiska nitrater har
orsakat methemoglobinemi hos till synes
normala patienter. Övergående perioder
av svindelkänsla, ibland relaterade till
förändringar i blodtrycket kan också
förekomma. Hypotoni förekommer
sällan, men kan hos vissa patienter vara
så allvarig att behandlingen måste
avbrytas.

Förpackningsstorlek: tub, 30g.

För fullständig information: se
www.FASS.se

Referenser: 1. Bailey HR et al. Dis
Colon Rectum 2002; 45(9): 1192-
1199. 2. Sands L and the Glyceryl
Trinitrate Anal Fissure Study Group,
International Proceedings of
ECCP/EACP 2nd Annual Meeting,
Bologna, Italy, 15-17 September 2005,
p145-148

Prostrakan AB,
Geijersgatan 2, 216 18 Malmö.
Tel: 040-15 45 70

 **ProStrakan**
www.prostrakan.se



Nyhet Rectogesic®

Redo att ta itu
med smärtan
vid kroniska
analfissurer

Nyhet
Rectogesic® 4mg/g
rektalsalva med glyceryltrinitrat, 0,4%

Din salva för smärtfrihet

Rectogesic® 4mg/g (rektalsalva med glyceryltrinitrat,0,4%) nu tillgängligt i Sverige.

Rectogesic® har nyligen registrerats i Sverige och kommer att finnas tillgänglig på apoteken from v 10. Fram till dess vi får de svenska förpackningarna i april kommer vi att tillhandahålla tyska ommärkta förpackningar. Innehållet är exakt detsamma som i de svenska förpackningarna så det innebär ingen skillnad för patienten.

Rectogesic® skall användas för att lindra smärta i samband med kroniska analfissurer.

Rectogesic® är ett receptbelagt läkemedel och ingår i förmånssystemet.

Rectogesic® levereras i en tub om 30 gram vilket räcker till 5 veckors behandling. Behandlingen kan fortgå tills smärtan avtar, upp till högst 8 veckor.

För fullständig information se www.fass.se

Med vänlig hälsning

Håkan Granquist
Marknadsansvarig

ProStrakan AB
Geijersgatan 2, 216 18 Malmö Tel: 040-15 45 70